

Možnosti zmeny diskomfortu nezrelého novorodenca na komfort pri dojčení

Diskomfort



Komfort



Čo ovplyvňuje ???

- Nezrelý novorodenec
- matka
- Externé prostredie
- Personál

Nezrelý novorodenec

- Nezrelý novorodenec
- Bonding po pôrode
- KMC
- Koordinácia – 34 týždeň tehotnosti

Matka

- Pôrod – nezrelý novorodenec
- Bonding
- Predchádzajúce skúsenosti
- Laktácia
- Vzedelanie matky
- Komplikácie

Externe prostredie

- Tradícia v rodine
- Skúsenosti

Personál

- Čo môžem urobiť JA ???

Ošetrovateľské intervencie

- Bonding / KMC
- Štandardizované informácie
- Podporovať pri rozhodovaní / pri dojení
- Kontinuita ošetrovateľskej starostlivosti
- Spolupráca v multidisciplinárnom tíme

Dojčenie nezrelého novorodenca

- Ideál – pri každej návšteve matky
- Množstvo vypitého mlieka – nie je podstatné
- Eventuálne váženie ak nastáva transfer
- Dokrmovanie na prsníku
- Poloha pri dojčení

Štatistika AKH- Viedeň 2012

- Pod 1500g – prepustených 63% vyživovaných s materským mliekom
- Transefovaných – 83% vyživovaných s materským mliekom

Komfort



Ďakujem za pozornosť

"Prísť spolu je začiatok, zostať spolu je pokrok a
pracovať spoločne je úspech."
- Henry Ford